

Patógeno	Enfermedad	Control	Dosis
<i>Peronospora sparsa</i>	Mildiu del rosal Moho veloso	Folpet más foseetil aluminio	Con los primeros síntomas, repetir a los quince días.
	Otros fungicidas recomendados: Zineb, captafol, maneb y mancozeb (preventivos), Propamicarb (curativo)		Aplicar dosis según prospecto.
<i>Phragmidium subcorticium</i> (<i>P. mucronatum</i>)	Roya del rosal	Oxicarboxim	Cada siete días como curativo. Cada diez o quince días como preventivo.
		Oxiclورو de cobre	Comienzos de brotación. Repetir cada quince días hasta frenar ataque.
		Triforine	Con los primeros síntomas. Repetir cada quince días en ataques graves.
		Zineb	Al comienzo de la brotación. Repetir cada diez o quince días.
	Tratamiento preventivo de la roya: Proteger follaje con myclobutanil, triadimefon o mancozeb. Destruir las hojas infectadas. Tratamiento preventivo: maneb 2 gr cada litro de agua.		Durante el invierno. No regar sobre el follaje. Las dosis hay que fijarlas según la etiqueta de los productos recomendados.
<i>Botrytis cinerea</i>	Tizón Podredumbre	Folpet	Al abrir las yemas, repetir cada 15 días.
	Otros fungicidas recomendados: Chlorotalonil, iprodione, mancozeb, captafol, benomil, captan, maneb Tratamiento preventivo-curativo: tiabendazol, benomil, benelaxil		Eliminar hojas y flores atacadas y aplicar cualquiera de los fungicidas recomendados.
<i>Diplocarpon rosae</i>	Mancha negra	Dodine	Con los primeros síntomas.
		Captan Mancozeb	Repetir cada diez o quince días. Con la brotación en primavera. Repetir cada diez días.
		Maneb	Con la brotación. Repetir cada diez días.
		Zineb	Al comienzo de la brotación. Repetir cada quince días según las condiciones climáticas.
		Ziram	Al comienzo de la brotación. Repetir cada diez días.
	Medidas preventivas: Recoger las hojas caídas al pie de la planta y quemarlas para impedir que el hongo vuelva a enfermarla. Proteger de manera preventiva con pulverizaciones de Chlorotalonil. Pueden usarse también triforine, propiconazol, imazalil.		Las dosis deben aplicarse según las etiquetas de los productos.
<i>Verticilium albo-atrum</i>	Marchitamiento del rosal	No hay productos efectivos para combatir la enfermedad. Comprar plantas sanas, resistentes. Tratar el suelo, con riegos de benomil, carbendazim o metil tiofanato, dazomet.	
<i>Marssonina rosae</i>	Mancha pardo rojiza	Maneb	Comenzar con la brotación. Repetir cada diez o quince días.
		Ziram	Al inicio de la brotación. Repetir cada diez o quince días.
		Captan	Con los primeros síntomas. Repetir cada diez o quince días.